



SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO n° 12 – 13 LUGLIO 2022



SITUAZIONE CLIMATICA

la **situazione di instabilità** iniziata tra martedì e mercoledì scorso ha regalato una settimana di pausa dal caldo torrido dell'ultimo periodo,
Piovosità concentrate principalmente nel mezzo della settimana scorsa, con l'alta pressione che ha portato **tempo sereno** e **temperature in rialzo**.
A condizioni **soleggiate** e di **temperature** nuovamente **in aumento**, si alterneranno passaggi nuvolosi con isolate precipitazioni di modesta intensità.



Questo l'andamento medio delle temperature in **PIANURA**:





Questo l'andamento medio delle temperature in **COLLINA**:



Nel grafico a seguire, l'andamento delle **piovosità** nell'ultima settimana, nelle principali località monitorate da **CECAT**:



Nel grafico a seguire, un confronto fra l'andamento delle **piovosità** da inizio aprile ad oggi, nelle principali località monitorate da **CECAT**:



SITUAZIONE FENOLOGICA

Proseguono i monitoraggi dell'avanzamento delle fasi fenologiche.

La situazione siccitosa di alcune zone ha **rallentato l'avanzamento delle fasi fenologiche**, in particolar modo nei vigneti non irrigati e in carenza di precipitazioni.

Nella maggior parte delle zone monitorate è possibile osservare per la Glera una fase intermedia tra la **prechiusura del grappolo** (fase fenologica BBCH 77, Baggiolini L) e la **chiusura del grappolo** (fase fenologica BBCH 79, Baggiolini L).

Per i vitigni più precoci, in particolare Pinot grigio, si registra la fase di **inizio invaiatura** (fase fenologica BBCH 81, Baggiolini M).

SITUAZIONE FITOSANITARIA

BIOLOGICO e CONVENZIONALE:

Visto lo sviluppo fenologico e l'evoluzione meteo, si consiglia di effettuare un trattamento entro la giornata di **lunedì 18 luglio**.

PERONOSPORA

- **Poltiglia Bordolese** (200-300 g/ha di rame metallo)

OIDIO

- **Zolfo** a dosaggio medio – alto (5 kg/ha)

TRATTAMENTO SCAPHOIDEUS TITANUS:

Dal monitoraggio di CECAT in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova si segnalano catture di esemplari adulti di **Scaphoideus titanus** in diversi vigneti del territorio.

Se verificata la presenza dell'insetto adulto con il monitoraggio tramite trappole cromotropiche, si consiglia di procedere con un intervento insetticida, rivolgendosi al proprio **Tecnico di riferimento per valutare e posizionare al meglio l'intervento insetticida**.

Verificare le prescrizioni in etichetta per l'impiego contro Scaphoideus titanus, tenendo conto delle limitazioni riportate in etichetta, nei Protocolli viticoli e nei Regolamenti di zona.

Si ricorda la corretta gestione del coticco erboso e della chioma, con particolare attenzione a non avere una vegetazione lussureggiante, che fa da schermo ai trattamenti, e quindi da riparo all'insetto vettore

Si ricorda di trattare nelle ore serali con assenza di luce solare diretta.

Evitare la miscela con altri Prodotti fitosanitari.

BIOLOGICO:

Si ricorda di intervenire con un trattamento insetticida **entro venerdì 15 luglio** a base di **Piretro**, avendo cura di variare il prodotto dagli interventi precedenti.

CONVENZIONALE:

Se verificata la presenza dell'insetto adulto con il monitoraggio tramite trappole cromotropiche, si consiglia di procedere con un intervento insetticida utilizzando piretroidi (Deltametrina ed Etofenprox). Per le tempistiche di intervento, variabili di zona in zona, rivolgersi al proprio **Tecnico di riferimento**.

Grafici ed elaborazioni dati sono proprietà del CECAT, Centro per l'Educazione, la Cooperazione e l'Assistenza Tecnica, ed è pertanto vietato utilizzarli, riprodurli e/o modificarli inserendoli in altre pubblicazioni elettroniche o stampate senza l'esplicito consenso scritto del proprietario.