

## SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA



BOLLETTINO n° 3 – 04 MAGGIO 2021

### SITUAZIONE CLIMATICA



La **circolazione ciclonica** che si è affacciata sul nostro territorio nelle ultime settimane conclude il mese di **Aprile** confermando un andamento delle **temperature sotto le medie storiche**. Oltre all'abbassamento di temperatura, anche l'ultima settimana non è stata avara di **precipitazioni**, con picchi di 40-50 mm nelle **colline della Marca Trevigiana** nella giornata di **venerdì 30 Aprile**.

**Solo dal fine settimana l'anticiclone porterà schiarite e tempo stabile, nel frattempo continua l'instabilità che ha caratterizzato l'ultimo periodo, in particolar modo sulle zone pedemontane.**



Questo l'andamento medio delle temperature in **PIANURA**:



Questo l'andamento medio delle temperature in **COLLINA**:



Nel grafico a seguire, l'andamento delle **piovosità** degli ultimi 10 giorni, nelle principali località monitorate da **CECAT**:




## SITUAZIONE FENOLOGICA

Si accentuano le differenze fra le varie zone nello sviluppo fenologico. Dove il germogliamento è stato più anticipato come nella maggior parte delle aree di **pianura**, si individua la fase di **sviluppo delle foglie** (fase fenologica BBCH 13, Baggiolini E).

Le zone di **collina** in cui il germogliamento è storicamente più tardivo, si attestano invece alla fase delle **prime foglie distese** (fase fenologica BBCH 11, Baggiolini D-E).

A seguire inseriamo due grafici che evidenziano lo sviluppo medio della fenologia nei vigneti delle varie zone monitorate da CECAT:



## SITUAZIONE FITOSANITARIA





Vista l'evoluzione meteo per i prossimi giorni, si consiglia di effettuare un **trattamento** entro la giornata di **giovedì 6 Aprile** dove i germogli hanno raggiunto almeno i 10 cm di lunghezza.

Per vigneti a **conduzione convenzionale** si consiglia l'utilizzo di **prodotti di copertura** o **prodotti rameici** unitamente a **zolfo**.

Per i vigneti a **conduzione bio** si consiglia l'utilizzo di **prodotti rameici unitamente a zolfo**.

Per qualsiasi ulteriore problematica, **contattare il Tecnico di riferimento**.

È in corso il monitoraggio tramite trappole a feromoni della generazione svernante di **tignola** e **tignoletta**. A seguire inseriamo un prospetto con le catture nelle varie località monitorate da CECAT:



Grafici ed elaborazioni dati sono proprietà del CECAT, Centro per l'Educazione, la Cooperazione e l'Assistenza Tecnica, ed è pertanto vietato utilizzarli, riprodurli e/o modificarli inserendoli in altre pubblicazioni elettroniche o stampate senza l'esplicito consenso scritto del proprietario.